

Langwerkende antireumatische middelen: Goudinjecties (Tauredon®).
Zorgeneheid Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU.

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten goudinjecties te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Goudinjecties behoren tot de langwerkende medicijnen. Langwerkende medicijnen zijn niet direct pijnstillend, maar kunnen de activiteit van de reumatische aandoening op langere termijn onderdrukken. Hierdoor nemen klachten als pijn, zwelling en stijfheid af en zijn minder kortwerkende medicijnen (vooral pijnstillers) nodig. Goudinjecties remmen het ontstekingsproces op de langere termijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Voor de behandeling van de reumatische aandoening worden de goudinjecties meestal naast kortwerkende medicijnen (NSAID) gebruikt.

Behandelmethode

- Aurothiomalaat is de werkzame stof en is bekend onder de naam Tauredon®.
- Goudinjecties worden door uw huisarts of door een (wijk)verpleegkundige toegediend in de spieren (intramusculair) van uw bil of uw bovenbeen.
- Bij aanvang van de behandeling met goudinjecties begint u met een zogeheten opbouwschema. U start in week 1 met 10mg, in week 2 krijgt u 25mg en in week 3 krijgt u 50mg. Vanaf week 3 is de dosering **altijd** 50mg.
- In het begin krijgt u 1 injectie per week. Meestal kan na verloop van tijd de frequentie worden aangepast en heeft u minder vaak de injecties nodig. De dosering blijft hierbij altijd 50mg.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van goudinjecties zijn:

- Jeukende huiduitslag.
- Blaasjes in de mond- en keelholte.
- Ontsteking van de dikke darm.
- Ontsteking van het slijmvlies van de vagina.
- Gestoorde aanmaak van bloedplaatjes, witte bloedcellen en rode bloedcellen.
Tekenen van een gestoorde bloedaanmaak zijn erge keelpijn in combinatie met koorts, herhaaldelijke bloedneuzen en het snel krijgen van blauwe plekken.
- Eiwitverlies in de urine (soms te merken aan schuim op de urine).

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw reumatoloog of de verpleegkundig reumaconsulent regelmatig uw bloed en urine onderzoeken. Het eerste jaar om de twee injecties.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw (huis)arts of de verpleegkundig reumaconsulent.
- De huiduitslag kan verergeren onder invloed van zonlicht. Vermijd daarom teveel zonlicht en ga niet onder de zonnebank.
- Als u geopereerd moet worden, hoeven de goudinjecties niet te worden gestopt.
- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw reumatoloog noodzakelijk. Goudinjecties kunnen schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Doorgaans is het advies om de goudinjecties 12 maanden voor de zwangerschap te staken.
- Als u goudinjecties gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.

- Mannen met een kinderwens kunnen de goudinjecties blijven gebruiken.
- Hebt u vragen over zwangerschap, overleg met uw (huis)arts of verpleegkundig reumaconsulent.
- Als u goudinjecties gebruikt, is er geen bezwaar tegen de 'grieprik' en/of andere vaccinaties.

Vragen

Neem gerust contact op met het UMC Utrecht als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen. U kunt uw vraag 24 uur per dag op het antwoordapparaat van onze helpline inspreken. Als u voor 16.00 uur belt, wordt u dezelfde werkdag nog teruggebeld. Indien u uw vraag na 16.00 uur inspreekt wordt u de volgende werkdag teruggebeld. Het telefoonnummer van de helpline is 088 - 7551494. Wij kunnen uw vragen ook via de e-mail beantwoorden. Het e-mailadres is poli-reumatologie@umcutrecht.nl

© mei 2007, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie,
Zorgaanheid Reumatologie en Klinische Immunologie,
Afdeling Patiëntencommunicatie. DIGD.11.010